

Аналитические материалы ВНИРО о вылове тихоокеанских лососей на 5.07.2017 года

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на отчетную дату составил 18,6 тыс. т (+3,1 тыс. т в сравнении с VI пятидневкой июня) и превышает показатели 2016 г. (для горбуши — цикличного 2015 г.) на 1,9 тыс. т (табл. 1).

В тройку лидеров по уровню добычи входят нерка, кета и горбуша. Их вылов превышает показатели предыдущих лет. Отставание от предыдущего года наблюдается по малочисленным видам тихоокеанских лососей — чавыче и сима (табл. 1).

На отчетную дату в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 12,7 тыс. т нерки. Прирост ее вылова за пятидневку составил 0,5 тыс. т. Основным районом промысла остается Петропавловско-Командорская подзона с суммарным объемом добычи с начала путины 11,7 тыс. т. или 83,8% от объема, рекомендованного Отраслевым советом по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве (Протокол от 31.01.2017 г. № 1).

Хорошие уловы нерки наблюдаются в Карагинской подзоне, где с начала промысла добыто 0,5 тыс. т или 15,2% от рекомендованного вылова. Прирост вылова за неделю составил 0,08 тыс. т. Однако в текущем году Карагинская подзона по уровню добычи уступает 2016 г. (табл. 1, рис.).

Вылов кеты и горбуши на отчетную дату составляет 3,1 и 2,4 тыс. т, а их прирост за пятидневку равен 1,3 и 1,4 тыс. т, соответственно.

Основным районом их вылова является Карагинская подзона, в которой уровень добычи горбуши не на много превышает показатели цикличного 2015 г. (+6,0%), но объемы вылова кеты существенно выше, чем в 2016 г. (+75,3%) (табл. 1).

Таблица 1. Вылов тихоокеанских лососей по состоянию на I пятидневку июля, тонн

Зона (подзона)/промрайон	Год/вид																	
	2016 ¹						2017						Δ 2017 к 2016 г., %					
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима
Чукотский АО																		
Западно-Берингоморская	5,96	0,98	175,45	–	0,15	–	0,79	0,22	10,64	–	–	–	–86,8	–77,8	–93,9	–	–	–
Камчатский край																		
Западно-Берингоморская	0,78	0,51	41,33	–	–	–	13,43	0,65	114,41	–	–	–	+1633,4	+26,7	+176,8	–	–	–
Карагинская	1678,04	792,01	549,64	–	28,39	–	1778,20	1388,70	475,51	–	23,14	–	+6,0	+75,3	–13,5	–	–18,5	–
Петропавловско-Командорская	49,33	237,18	10045,99	0,02	593,09	–	19,02	179,69	11669,80	–	258,14	–	–61,4	–24,2	+16,2	–	–56,5	–
Западно-Камчатская	6,55	565,92	60,50	–	4,41	0,20	3,79	356,17	55,15	–	4,68	0,10	–42,1	–37,1	–8,8	–	+6,3	–51,3
Камчатско-Курильская	–	0,34	133,73	–	10,19	0,49	0,09	56,01	162,31	0,01	9,98	0,40	–	+16470,1	+21,4	–	–2,0	–19,2
Магаданская область																		
Магаданская область	305,38	55,02	0,75	–	–	–	95,19	34,14	0,43	–	–	–	–68,8	–37,9	–42,4	–	–	–
Хабаровский край																		
р. Амур и лиман	0,14	–	–	–	–	–	–	254,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северное Приморье	3,15	–	–	–	–	–	8,15	–	–	–	–	–	+159,1	–	–	–	–	–
Приморский край																		
Южное Приморье	0,36	0,001	–	–	–	0,89	0,001	0,002	–	–	–	0,01	–99,7	+100,0	–	–	–	–99,0
Сахалинская область																		
Восточно-Сахалинская	1,12	–	–	–	–	1,32	–	–	–	–	–	1,22	–	–	–	–	–	–7,7
Юго-западный Сахалин	–	0,74	–	–	–	0,38	–	–	–	–	–	0,02	–	–	–	–	–	–95,0
Северо-западный Сахалин	0,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северо-Курильская	198,41	836,76	176,44	0,15	–	–	434,69	815,64	249,95	3,02	–	–	+119,1	–2,5	+41,7	+1910,7	–	–
Камчатско-Курильская	–	77,89	16,21	–	–	–	17,93	59,55	22,49	–	–	–	–	–23,5	+38,8	–	–	–
Итого	2249,45	2567,34	11200,04	0,17	636,22	3,28	2371,30	3144,76	12760,69	3,03	295,94	1,74	+5,4	+22,5	+13,9	+1681,2	–53,5	–46,9

Примечание: ¹ — для горбуши приведены данные за 2015 г.




Рис. 1. Динамика вылова нерки в Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах в 2015–2017 гг.

Вторую позицию по уровню добычи кеты и горбуши занимает Северо-Курильская зона. В этом промысловом районе доминирует кета, но ее вылов находится на уровне 2015 г. и незначительно уступает 2016 г. (–2,5%). Вылов горбуши больше чем в 2 раза превосходит показатель цикличного 2015 г. (+119,1%) (табл. 1, рис. 2).




Рис. 2. Динамика вылова горбуши и кеты в Северо-Курильской подзоне в 2015–2017 гг.

Обращает на себя внимание высокая интенсивность подходов кеты в р. Амур. На отчетную дату ее вылов составил 0,24 тыс. т и существенно превышает показатели 2015 и 2016 гг. (табл. 1, рис. 3).




Рис. 3. Динамика вылова кеты в р. Амур и его лимане в 2015–2017 гг.

В настоящее время только Магаданская область по показателям вылова горбуши и кеты отстает от предыдущих лет (рис. 4), но в регионе основные подходы этих видов еще только ожидаются. В среднемноголетнем аспекте массовый ход горбуши начнется только во II пятидневке июля, а кеты — в августе.




Рис. 4. Динамика вылова горбуши и кеты в Магаданской области в 2015–2017 гг.

Аналитические материалы подготовлены на основании данных о вылове тихоокеанских лососей, представленных Северо-Восточным, Северо-

Курильским, Охотским и Приморским теруправлениями Росрыболовства, а также Агентством по рыболовству Сахалинской области.